

LE CALENDRIER DES SEMIS

Il importe de semer au bon moment. De jeunes plants qui stagnent en caissettes perdent une grande partie de leur vigueur et de leur précocité. En respectant la date du semis proposée dans ce calendrier, les plants seront prêts à être transplantés au bon moment sans qu'ils ne subissent d'interruption de croissance.

Date	Espèces à semer (semis intérieur)
1 ^{er} mars	Céleri-rave, poireau, oignon, artichaut.
15 mars	Laitue (1 ^{er} semis), céleri, aubergine, poivron, piment.
1 ^{er} avril	Tomate, cerise de terre, herbes aromatiques, la plupart des fleurs.
15 avril	Chou pommé, chou de Bruxelles, laitue (2 ^e semis).
1 ^{er} mai	Melon, brocoli et chou-fleur, cosmos, tournesol.
15 juin	Laitue (3 ^e semis).

Date	Calendrier pour les semis directs et les transplantations
Fin avril	<i>Semis direct</i> : ail de printemps, oignonnet.
Début mai	<i>Semis direct</i> : radis (1 ^{er} semis), navet, pois, épinard, laitue (1 ^{er} semis), chicorée, roquette, moutarde, mâche. <i>Transplantation</i> : laitue (1 ^{er} semis), oignon, poireau.
Mi-mai	<i>Semis direct</i> : carotte, betterave et chou-rave (1 ^{er} semis), radis (2 ^e semis), panais, salsifis, bette à carde, pomme de terre, tournesol. <i>Transplantation</i> : artichaut, tournesol, chicorée, persil.
Fin mai	<i>Semis direct</i> : maïs. <i>Transplantation</i> : tomate et melon (avec protection), brocoli et chou-fleur (1 ^{er} semis), céleri, céleri-rave.
Début juin	<i>Semis direct</i> : carotte (2 ^e semis), haricot (1 ^{er} semis), laitue (2 ^e semis), courge, citrouille, concombre. <i>Transplantation</i> : chou pommé, chou de Bruxelles, laitue (2 ^e semis).
Dernier gel	<i>Semis direct</i> : betterave et chou-rave (2 ^e semis), rutabaga, basilic. <i>Transplantation</i> : aubergine, poivron, piment, tomate, cerise de terre, melon, brocoli et chou-fleur, tagète, sarriette, thym, romarin, basilic, sauge, la plupart des fleurs.
20 juin	<i>Semis direct</i> : haricot (2 ^e semis).
Début août	<i>Semis direct</i> : laitue, chicorée, épinard, roquette, moutarde, mâche, radis, navet. <i>Transplantation</i> : laitue (3 ^e semis).
Fin octobre	<i>Semis direct</i> : ail d'automne.

Ce calendrier a été conçu pour la Zone 4, donc pour l'Estrie, Lanaudière, l'Outaouais, la Mauricie, le Centre du Québec et les Basses Laurentides. Pour Montréal et sa banlieue, on peut devancer les interventions de 2 semaines. Dans les Hautes Laurentides, dans Charlevoix, au Lac Saint-Jean, en Abitibi, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, on les retardera de 2 semaines.

Créé par Yves Gagnon

Profondeur

Semer à une profondeur correspondant à trois fois le diamètre de la semence.

De 5 mm pour les petites semences à 3 cm pour les plus grosses.

Un tableau des densités au jardin est aussi disponible sur notre Blogue ! Bon jardinage !